

Instructies na implantaatbehandeling bovenkaak edentaat.

1. Vandaag de mond niet spoelen, geen alcohol en geen warme dranken drinken zoals koffie of thee. Dit kan een nabloeding veroorzaken.
De eerste weken na de ingreep niet roken, dit kan een vertraagde wondgenezing tot gevolg hebben.
2. Na thuiskomst een ijszak in een washandje of een coldpack tegen de lip of wang houden gedurende een half uur. Dit 5 maal herhalen met tussenpauzes van een half uur (half uur tegen lip/wang, half uur eraf).
Dit gaat eventuele zwelling en/of blauw worden tegen.
3. Gebruik eventueel een extra hoofdkussen tijdens het slapen, zodat het hoofd wat hoger ligt.
4. U dient gedurende 3 maanden de bovenprothese 's nachts uit te nemen.
Tijdens deze 3 maanden mag u alleen zacht voedsel eten.
5. Wanneer de bovenprothese pijn veroorzaakt, kunt u deze beter enkele dagen niet dragen.
6. Vanaf morgen 2 maal daags spoelen met Perio-Aid spoelvloeistof gedurende 2 weken (tot de hechtingen verwijderd zijn).
7. Na thuiskomst mag u bij pijn steeds 2 paracetamol nemen met een maximum van 8 per dag.
8. Bij problemen kunt u tijdens kantooruren altijd bellen naar de praktijk, telnr: 040-3033773.