

Instructie Opalescence PF bleekgel.


Voorzorgsmaatregelen voor het bleken:

1. Gebruik geen huishoudelijk bleekmiddel om tanden te bleken.
2. Zwangere vrouwen dienen hun tanden niet te bleken.
3. Als u vragen hebt over het juiste gebruik van dit product, inclusief de tijd die nodig is om uw tanden te bleken, raadpleeg dan uw tandarts zo snel mogelijk.
4. Gebruik geen tabaksproducten en eet niet tijdens het bleken.
5. Witte plekken die op het tandglazuur aanwezig zijn of die tijdens het bleken verschijnen, kunnen gedurende het continue bleekproces in elkaar overlopen.
6. Tandens zijn van nature donkerder langs de tandvleeslijn. Het bleken van deze plaatsen kost wellicht meer tijd dan de rest van het tandoppervlak; deze plaatsen blijven dan ook meestal iets donkerder.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

1. Een klein percentage patiënten ondervindt gevoeligheid tijdens het bleken. Als dit plaatsvindt, verwijder dan de bleeklepel en neem contact op met uw tandarts.
2. Voedsel en vruchtensappen met een hoog citroenzuurgehalte kunnen gevoelige tanden veroorzaken.
3. Sommige patiënten krijgen tijdelijk een ongemakkelijk gevoel van tandvlees, lippen, keel of tong. Als deze symptomen langer dan twee dagen aanhouden of langzamerhand erger worden, bel dan uw tandarts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-3 dagen nadat de behandeling is stopgezet.
4. Koffie, tabak en andere producten kunnen ervoor zorgen dat uw tanden in de loop der tijd weer verkleuren. Als dit gebeurt, kunnen de tanden in een paar nachten opnieuw worden gebleekt met Opalescence.
5. Regelmatige controle door de tandarts en reiniging door de mondhygiënist zijn belangrijk zowel vóór als na het bleken om een gezonde glimlach te behouden.
6. Sommige oude amalgaam- of “zilveren” vullingen kunnen een donkere, paarse kleur achterlaten in uw bleeklepel; dit is normaal.
7. Kronen, bruggen, partiële gebitsprothesen, veneers en composietvullingen kunnen niet worden gebleekt.
8. Het bleekmiddel moet op een plaats worden bewaard waar het niet aan zon of hitte wordt blootgesteld. Het is raadzaam het product in de koelkast te bewaren. Niet invriezen.
9. Gooi eventuele ongebruikte bleekgel weg, nadat de behandeling is voltooid.
10. Houd Opalescence buiten het bereik van kleine kinderen.


11. Slik gel of gespoelde gel niet in. Het product bevat peroxide en kan fluoride bevatten; het inslikken van grote hoeveelheden kan schadelijk zijn.
12. Het product moet in de koelkast (2-8 °C) worden bewaard om de houdbaarheid te garanderen.



Volg de instructie van uw tandarts waarop u uw aangepaste bleeklepels met de gel vult. Gebruik niet meer dan 1/3 tot 1/2 van de inhoud van de spuit.



Borstel uw tanden voordat u de bleeklepel plaatst. Tik lichtjes tegen de bleeklepel zodat de zijkanten ervan zich aan de tanden aanpassen. Draag Opalescence 10% 8-10 uur of 's nachts en Opalescence 16% 4-6 uur.



Verwijder overtollige gel met een schone vinger of een zachte tandenborstel. Spoel 2 keer, slik het spoelwater niet in.



Als er aanzienlijke gevoeligheid optreedt stop dan met bleken en raadpleeg uw tandarts.

Reinig de bleeklepel met een zachte tandenborstel en koel kraanwater. Bewaar de lepel in de meegeleverde doos.

13. Bij problemen kunt u tijdens kantooruren altijd bellen naar de praktijk, telnr: 040-3033773.